

پرشور کنفرانس اداره های مدارس آلمان سویس (DVK) جهت کمک و راهنمایی

## شیوه عمل در زمان ظهور علائم بیماری و علائم سرماخوردگی در کودکان مهد کودک (1H و 2H) \*

معتبر تا مارس ۲۰۲۲

اذهنمایی و توصیه برای والدین

زمانی ملزم به انجام تست هستید که:

- تماس نزدیک (تماس داری ریسک) با شخصی دارای علائم بیماری و با سن بیش از ۶ سال انجام گرفته باشد.
- تماس نزدیک (تماس داری ریسک) با شخصی که تست او مثبت می باشد - بدون توجه به سن او - انجام گرفته باشد.
- حداقل یکی از علائم مشخص شده با رنگ قرمز، حتی بدون تماس داری ریسک، وجود داشته باشد. علائم یک بیماری مزمن شناخته شده برای ارزیابی وضعیت در نظر گرفته نمی شود.

سرفه شدید اگر دلیل آن بیماری مزمن مانند آسم نیست و / یا تب بالای ۳۸.۵ درجه

ریزش آب بینی و / یا گلو درد با / بدون سرفه خفیف و بدون تب

حال عمومی کودک خوب نیست

حال عمومی کودک تا حدودی خوب است

حال عمومی کودک خوب است

بله

خیر

بله

خیر

بله

منفی

بله

مثبت

کودک شما اجازه دارد به مهد کودک برود.

## برشور کنفرانس اداره های مدارس آلمان سوویس (DVK) جهت کمک و راهنمایی شیوه عمل در زمان ظهور علائم بیماری و علائم سرماخوردگی در نوجوانان مقطع Primar و مقطع (3<sup>H</sup> و 11<sup>H</sup>)\* Oberschule

راهنمایی و توصیه برای والدین

چه زمانی فرزند شما باید در خانه بماند؟

اکنون معیارهای بالینی مشابهی برای بزرگسالان و کودکان و نوجوانان در مقطع Primar و 11<sup>H</sup> Oberschule و (3<sup>H</sup>) اعمال می شود. به این معنی که:

- در صورت بروز علائم بیماری و سرماخوردگی که با کووید-۱۹ همسان باشند، کودک یا نوجوان در خانه می ماند و توسط پزشک تست می شود.
- ← در صورت مثبت بودن تست، باید که بیمار ایزوله شود.
- ← در صورت منفی بودن تست، کودک یا نوجوان باید تا ۲۴ ساعت بدون تب، در خانه بماند. هنگامی که او دوباره احساس کرد که حالش خوب است و وضعیت عمومی خوبی داشت، می تواند به مدرسه بازگردد.

به دلیل انجام این روش ساده، نیازی به دستورالعمل جداگانه برای مدارس مقطع Primar و Oberschule نیست.

\* مطابق نوع نوشتاری HarmoS